

全身麻醉說明及注意事項

親愛的患者，您的病情經診治後，認為手術為必要之治療方式，而在手術過程中，為了使手術能順利進行，以及使您的生理狀態維持在最穩定的狀態，因此，您手術時必須接受本院麻醉科醫療團隊所提供之麻醉醫療服務，為了使您了解整個麻醉進行過程，茲將全身麻醉實行步驟以及可能發生之副作用及併發症說明如下：

一、全身麻醉實行步驟：

(一) 首先在您身上接上生理監視器，以監測您的血壓、心跳、血中氧氣濃度等生理數值。

(二) 然後從點滴注射麻醉藥物及肌肉鬆弛劑。

(三) 待您完全失去意識及肌肉完全放鬆後，藉助喉頭鏡的幫助，將氣管內管從口腔插入氣管內。



(四) 在手術過程中，以氣體的麻醉藥物、靜脈的麻醉藥物、肌肉鬆弛劑以及人工呼吸器來維持麻醉及您的生理狀態，以利手術進行（此時您無自主的呼吸功能）。

(五) 待手術結束，您的意識、呼吸功能及各種生理指標均恢復正常，將氣管內管拔除後，即可回到病房休息。

二、任何醫療服務都有一定的風險，故在您接受我們所提供之麻醉醫療時，部

份患者有可能會發生以下之副作用及併發症：

- (一) 如果您目前患有心臟病、高血壓等心臟血管系統之疾病或腦血管疾病，較易引起突發性的心臟病變或腦血管病變等併發症。
- (二) 如果您目前患有糖尿病，較易因血糖不穩定而產生相關併發症之情形。
- (三) 如果您目前患有肺部疾病，較易發生氣喘或呼吸功能失調等呼吸系統之併發症。
- (四) 如果您是接受急診手術、空腹時間不足六小時、懷孕、接受腸阻塞手術或少數對麻醉藥物較為敏感之患者，於手術麻醉時較易產生嘔吐而造成吸入性肺炎之可能。
- (五) 您在接受手術麻醉醫療的過程中，有可能因為您的體質而對某些藥物或輸血時產生過敏反應。
- (六) 有極少數之患者可能會因您的特異體質而對肌肉鬆弛劑產生嚴重的過敏反應，進而引起惡性高熱（此為死亡率極高之遺傳性疾病）。
- (七) 如果您有鬆動之牙齒，在插管的過程中，有可能會對您的牙齒造成傷害。

如仍有任何麻醉醫療之問題請與病房護理站或本院麻醉科連絡，我們將竭誠為您解說，祝您早日康復！