

檢驗項目：β-HCG

健保編號：120221 人類絨毛膜促性腺激素免疫分析

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：血清 Serum、Heparin 血漿，採檢量 3ml，病患不需空腹。

採檢容器：白蓋或紅蓋採血管、含 heparin 的抗凝劑管。

報告時效：一般件：7 天以內（2~8°C 保存者） 急件：1 小時

參考區間：

1. 健康者：Negative：≤5 mIU/mL

Positive：≥25 mIU/mL

Gray zone：>5 mIU/mL~<25 mIU/mL

危險值：無。

臨床意義：

hCG 的生物作用是在懷孕時維持黃體的功能。它也影響類固醇的生成。孕婦的血清中主要含有完整的 hCG。測量 hCG 的濃度使得受精後僅一星期便可對懷孕作出診斷。在懷孕第一期時測定 hCG 是具有特別的重要性。在這時候升高的檢測值是表示絨毛膜癌、葡萄胎或多胎懷孕。降低的檢測值則表示先兆性或過期性流產、子宮外孕、妊娠中毒症或子宮內胎兒死亡。

補單、複檢時效：7 天以內。

影響檢驗結果的原因：無。

是否需簽署同意書：否

注意事項：無。