

檢驗項目：WBC differential count / 白血球分類計數

健保編號：080131

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：取 2ML 血液送檢

採檢容器：紫蓋真空採血管(含 EDTA)

報告時效：一般件：每天 急件：30 分鐘

參考區間：

Neutrophil% 40 – 75%

Lymphocyte% 20 – 45%

Monocyte% 2 – 10%

Eosinophil % 1 – 6%

Basophil% 0 – 1%

危險值：Band >5%，依照危險值通報作業辦法流程處理

臨床意義：

WBC DC 即血液中的白血球分類：

1 NEUT%：

增加：感染、發炎、組織壞死、代謝障礙、急性出血或溶血。

減少：感染、骨髓障礙、肝硬化、末稍血之血球破壞。

2 LYMPH%：

增加：傳染性單核球增多症、傳染性淋巴球增多症、德國麻疹。

減少：免疫不全症候群、腎上腺皮質素增加、淋巴循環缺損。

3 MONO%：

增加：感染性疾病、顆粒腫病、SLE、RA、斑疹傷寒、結核病、單核球性白血病。

減少：惡性貧血、敗血病。

4 EO%：增加：寄生蟲感染、過敏。

5 BASO%：增加：CML、天花、水痘、溶血性貧血、Hodgkin 氏病、重金屬中毒。

補單、複檢時效：12 小時

影響檢驗結果的原因：參閱注意事項

是否需患簽署同意書：否

注意事項：

採檢後，請 180 度輕微搖晃 8~10 次，以利抗凝劑混合均勻

Heparin 等抗凝劑會造成血球型態異常