

檢驗項目：75 gm Glucose Tolerance Test；75 gm GTT；75 gm OGTT

健保編號：090074 (產檢)75 公克葡萄糖耐受性試驗

院內檢驗  委外代檢

檢體採檢：0.5ml 血清或血漿 0.5ml。75 gm GTT：孕婦 24~28 週間做妊娠糖尿病篩檢  
飲用糖水前先取得飯前空腹血糖檢體。再口服 75 公克葡萄糖，在 5 分鐘內飲用完畢，以開始飲用起算起每隔 1 小時抽血採檢，2 個小時整採檢完成

採檢容器：血清：紅蓋真空採檢管(6ml)；血漿：灰蓋真空採檢管 NaF(2ml)

報告時效：一般件：每天急件：NA

參考區間：

空腹血糖	60 分鐘血糖	120 分鐘血糖
<92 mg/dL	<180 mg/dL	<153 mg/dL

警告/危急值通報：危急值: < 60 or > 500 mg/dl

臨床意義：

孕婦24~28週間做妊娠糖尿病篩檢

補單、複檢時效：<4 小時

影響檢驗結果的原因：溶血

是否需患簽署同意書：否

注意事項：

喝糖水後 1 小時抽血檢查，血糖濃度 > 180 mg/dL 時應進一步做正式耐糖試驗。孕婦做口服 75 公克葡萄糖檢查前則需禁食。

健保編號：240091 口服 75 公克葡萄糖，飲用糖水前先取得飯前空腹血糖檢體，在 5 分鐘內飲用完畢，以開始飲用起算起每隔 30 分鐘、60 分鐘、90 分鐘、120 分鐘抽血採檢，2 個小時整採檢完成

健保編號：240291 口服 75 公克葡萄糖，飲用糖水前先取得飯前空腹血糖檢體，在 5 分鐘內飲用完畢，以開始飲用起算起第 2 小時抽血採檢完成